

УДК 616.8-005

Ж.Х. Желдыбаева

Профессорская клиника КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

## КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Среди постинсультных больных (n=51) в возрасте 45-67 лет, проходивших лечение в раннем и позднем восстановительных периодах, у 35(68,4%) человек был ишемический инсульт, у 16(31,4%) – геморрагический инсульт, у которых выявлены различные сочетания неврологических нарушений: двигательных, чувствительных и когнитивных.

**Ключевые слова:** ишемический и геморрагический инсульт, медицинская реабилитация.

### Актуальность.

[1-3].

1.

2.

3.

[4, 5].

### Цель исследования.

2016 2017

### Задачи исследования.

1.

4.

24-48

5.

50%

2.

6.

«

»

7.

### Материал и методы.

2017

2016

51

- 100.

0 20

60

21

61 90

( ),

91

99

II

### Обсуждение.

2016

2017

- 51 (100%)

32 (62,8%)

19 (37,2%)

45

- 67 ( . 1).

1

3

Возраст Пол	45-50 лет	51-60 лет	61-67 лет	Всего
	8(15,7%)	14(27,5%)	10(19,6%)	32(62,8%)
	4(7,8%)	8(15,7%)	7(13,7%)	19(37,2%)
	12(23,5%)	22(43,2%)	17(33,3%)	51(100%)

45 50 8 (15,7%)  
 4 (7,8%) ; 51  
 60 - 14 (27,5%) ; 8 (15,7%)  
 61 67 - 10 (19,6%)  
 7 (13,7%)  
 35 (68,4%)  
 16  
 (31,4%) - ( . 2).

2

	Ранний восстановительный период (1-6 месяцев)	Поздний восстановительный период (6-12 месяцев)	Всего
<b>Ишемический инсульт</b>			
	2(3,9%)	17(33,3%)	19(37,2%)
	5(9,8%)	11(21,6%)	16(31,4%)
<b>Геморрагический инсульт</b>			
	-	8(15,7%)	8(15,7%)
	1(2%)	7(13,7%)	8(15,7%)
	8(15,7%)	43(84,3%)	51(100%)

4

	45-50 лет	51-60 лет	61-67 лет	Всего
<b>Ишемический инсульт</b>				
	6(11,8%)	9(17,7%)	9(17,7%)	19(37,2%)
	2(3,9%)	5(9,8%)	5(9,8%)	16(31,4%)
<b>Геморрагический инсульт</b>				
	2(3,9%)	5(9,8%)	1(2%)	8(15,7%)
	2(3,9%)	3(5,9%)	2(3,9%)	8(15,7%)
	12(23,5%)	22(43,2%)	17(33,3%)	51(100%)

35 (68,4%) -  
 - 16 (31,4%); 19 (37,2%)  
 8 (15,7%)  
 (51-60 61-67 )  
 9 (17,7%)

II

1 1  
 ( . 3).  
 3  
 8(15,7%)  
 2 (3,9%) 5(9,8%)  
 1 (2%)  
 43 (84,3%)  
 17 (33,3%) 11 (21,6%)  
 8 (15,7%)  
 7 (13,7%)

	Симптомы и синдромы	Кол-во больных
1		47(92,2%)
2		45(88,2%)
3		47(92,2%)
4		27(52,9%)
5		23(45,1%)
6		15(29,4%)
7	-	14(27,3%)
8		7(13,7%)
9		7(13,7%)
10		4(7,8%)
11		3(5,9%)
12		2(3,9%)
13		2(3,9%)
14	-	1(2%)

45 (88,2%) - 27  
 (52,9%) - 23 (45,1%) -  
 15 (29,4%) 14 (27,3%) -  
 7 (13,7%)  
 7 (13,7%)  
 4  
 (7,8%) - 3 (5,9%), 2  
 (3,9%)  
 1 (2%)

( . 4).  
 4 47 (92,2%)

( . 5).

	Больные, перенесшие ишемический инсульт	Больные, перенесшие геморрагический инсульт
	93,4	78,5

5

2016

2017

-

35 (68,4%)

: 19 (37,2%)

16 (31,4%)

- 16 (31,4%)

: 8 (15,7%)

- 47 (92,2%)

( )-

45 (88,2%)

5

93,4

- 78,5

93,4

- 78,5

**Выводы.**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ... » //  
// 2010. - 3. - 85-86.
2. II  
« . 25-29. » - « 75-80-  
7-8 2010 . - . 123-124.
3. ...
4. ... 2004. - 300 .
5. //  
« . - 2004. - 3. - . 73-79.



—